

平成29年産米 生産履歴簿(慣行栽培用)

【注意事項】

1. 品種ごとに記入して下さい。
2. 田植月日及び収穫月日について、作業日が複数の場合は初日の作業日を記入して下さい。
3. 使用した農薬・資材に○をし、10aあたりの使用量及び使用時期を記入して下さい。
4. 液剤・水和剤については、散布した希釈液の量を記入して下さい。
5. 同一の農薬・肥料を使用し、使用月日が異なる場合は最初の使用日を記入して下さい。
6. 下記記載以外の薬剤を使用した場合は、空白欄に薬剤名を記入して下さい。
7. ヘリコプター防除を行われた場合は、裏面へ記入して下さい。
8. 肥料については、裏面に記入して下さい。
9. 記入後、出荷申込書とともにJAへ提出して下さい。

品種名	
種子更新	種子購入・苗購入・なし
	購入先( )
播種日	/
田植月日	/

住所	
自治会名	
氏名	Ⓜ
TEL	-

出穂日	/
収穫月日	/

生育段階 対象 病害虫	農薬名	使用 農薬 に○	使用量 (10aあたり)	使用時期	使用基準(詳しくは稲作ごよみに記載)	
					使用量 (10aあたり)	使用時期
育苗期	イチバン乳剤			月 日	500~1,000倍	
	タチガレエースM液剤		ml	月 日	500~1,000倍 500ml/箱	播種時又は発芽後
箱施用剤	スタウトダントツ箱粒剤		g	月 日	50g/箱	播種時~移植当日
	箱入り娘		g	月 日	50g/箱	移植7日前~移植当日
	デジタルコラトップアクタラ箱粒剤		g	月 日	50g/箱	移植3日前~移植当日
	デジタルメガフレア箱粒剤		g	月 日	50g/箱	移植3日前~移植当日
	側条オリゼメートフェルテラ顆粒水和剤		g	月 日	500g	移植時にペースト肥料に混和
初期剤	サキドリEW		ml	月 日	500ml	植代後~移植前7日、移植時~移植後30日まで
	ピラクロフロアブル		ml	月 日	500ml	植代後~移植前7日、移植時~移植後30日まで
	ピラクロン1キロ粒剤		kg	月 日	1kg	植代後~移植前7日、移植直後~移植後30日まで
初中期 一発剤	バッチリ1キロ粒剤		kg	月 日	1kg	移植時~移植後30日まで
	バッチリジャンボ		個	月 日	10個	移植直後~移植後30日まで
	ピクトリージャンボ		個	月 日	10個	移植後5日~移植後30日まで
	ピクトリー1キロ粒剤		kg	月 日	1kg	移植後5日~移植後30日まで
	サラブレットKAI1キロ粒剤		kg	月 日	1kg	移植時~移植後30日まで
	シリウスエグザ		kg	月 日	1kg	移植時~移植後30日まで
	カチボシ1キロ粒剤		kg	月 日	1kg	移植時~移植後30日まで
	カチボシジャンボ		個	月 日	10個	移植時~移植後30日まで
	カウンシルコンプリート1キロ粒剤		kg	月 日	1kg	移植時~移植後30日まで
カウンシルコンプリートジャンボ		個	月 日	10個	移植時~移植後30日まで	
中期剤	マメットSM1キロ粒剤		kg	月 日	1kg	移植後15日~30日まで
	ザーベックスDX1キロ粒剤		kg	月 日	1kg	移植後20日~30日まで
	バサグラン粒剤3kg		kg	月 日	3~4kg	移植後15日~55日(収穫60日前迄)
ヒエ専用剤	ヒエクリーン1キロ粒剤		kg	月 日	1kg	移植後15日~ノビエ4葉期(収穫45日前迄)
	ヒエクリーン豆つぶ		g	月 日	250g	移植後15日~ノビエ4葉期(収穫45日前迄)
中後期剤	テッケン1キロ粒剤		kg	月 日	1kg	移植後15日~ノビエ4葉期(収穫60日前迄)
	ハイカット1キロ粒剤		kg	月 日	1kg	移植後15日~ノビエ3.5葉(収穫60日前迄)
	フォローアップ1キロ粒剤		kg	月 日	1kg	移植後25日~ノビエ5葉期(収穫60日前迄)

生育段階 対象 病害虫	農薬名	使用 農薬 に○	使用量 (10aあたり)	使用時期	使用基準(詳しくは稲作ごよみに記載)	
					使用量 (10aあたり)	使用時期
いもち病	ノンプラスフロアブル		ℓ	月 日	1,000倍 60~150ℓ	収穫7日前まで
	ノンプラス粉剤DL		kg	月 日	3~4kg	収穫7日前まで
				月 日		
稲こじ 紋枯病	モンガリット粒剤		kg	月 日	3~4kg	収穫45日前まで
				月 日		
紋枯病	モンセレン粉剤DL		kg	月 日	3~4kg	収穫21日前まで
	モンカットフロアブル		ℓ	月 日	1,000~1,500倍	収穫14日前まで
いもち病 紋枯病				月 日		
				月 日		
いもち病 紋枯病 ウンカ カメムシ	オリブライト1キロ粒剤		kg	月 日	1kg	収穫45日前まで
				月 日		
いもち病 紋枯病 ウンカ カメムシ	ブラシントレバリダ粉剤DL		kg	月 日	3~4kg	収穫14日前まで
	ブラシントレバリダ水和剤		ℓ	月 日	500倍 150ℓ	収穫14日前まで
	アミスタートレボンSE		ℓ	月 日	1000倍	収穫21日前まで
いもち病 カメムシ ウンカ				月 日		
	ノンプラストレボン粉剤DL		kg	月 日	3~4kg	収穫7日前まで
	ビームスタークル粉剤5DL		kg	月 日	3~4kg	収穫7日前まで
いもち病 カメムシ ウンカ	ビームエイトスタークルゾル		ℓ	月 日	1,000倍 60~150ℓ	収穫7日前まで
				月 日		
				月 日		
カメムシ ウンカ	ダントツフロアブル		ℓ	月 日	5,000倍	収穫7日前まで
	ダントツ粒剤		kg	月 日	3~4kg	収穫7日前まで
	スタークル粉剤DL		kg	月 日	3kg	収穫7日前まで
	スタークル液剤10		ℓ	月 日	1,000倍 60~150ℓ	収穫7日前まで
	スタークル豆つぶ		kg	月 日	250g	収穫7日前まで
	トレボン粉剤DL		kg	月 日	3~4kg	収穫7日前まで

