

除草剤散布適期

初期剤＋初中期使用体

<初期剤>



ピラクロン
・フロアブル
・1キロ粒剤

○散布適期
植代後～田植7日前または田植直後～5日後まで(ノビエ1.5葉期)
○田植同時処理が可能



サキドリEW
・フロアブル

○散布適期
植代時～田植7日前または田植直後～5日後まで(ノビエ1.5葉期)

体系①

●植代から田植えまで1週間以上期間があり、植代後に初期剤を散布する場合

体系②


●田植後に初期剤を散布する場合

体系③


●初期剤と中期剤を散布する場合

初中期剤を散布する目安

体系①
移植後
～10日後



体系②
田植
15～20日後



体系③
田植
15～25日後



<初中期一発除草剤>



シリウスエグザ

・1キロ粒剤
田植同時散布機で施用可
移植時～ノビエ2.5葉期
(但し、移植後30日まで)

成分数
4



カチボシ

・1キロ粒剤
田植同時散布機で施用可
移植時～ノビエ2.5葉期
(但し、移植後30日まで)

成分数
3



アッパレZ

・1キロ粒剤
移植時～ノビエ3葉期
(但し、移植後30日まで)
(移植後5日からの使用を推奨)
・ジャンボ
移植後3日～ノビエ3葉期
(但し、移植後30日まで)

成分数
3



ジェイフレンド

・1キロ粒剤
田植同時散布機で施用可
移植時～ノビエ3葉期まで
(但し、移植後30日まで)

成分数
3



カウンシルコンプリント

・1キロ粒剤
移植後5日～ノビエ3.5葉期
(但し、移植後30日まで)

成分数
2



ビクトリーZ

・1キロ粒剤
移植時～ノビエ3葉期
(但し、移植後30日まで)
(移植後5日からの使用を推奨)
・ジャンボ
移植後5日～ノビエ3.0葉期
(但し、移植後30日まで)

成分数
2

<中期剤>



マメットSM

・1キロ粒
移植後15日～30日(イネ5葉期以降)
ノビエ3.5葉期まで

成分数
2



**セカンドショットS
ジャンボMX**

移植後20日～ノビエ3.5葉期
但し収穫45日前まで

成分数
3

<中・後期剤>



成分数
1

バサグラン粒剤

【広葉雑草のみ】
※落水して使用
(3～4 kg/10a)
移植後15日～55日
但し収穫60日前まで



成分数
1

ヒエクリーン

【ヒエのみ】
・1キロ粒剤 ・豆つぶ
移植後15日～ノビエ4葉期
但し、収穫45日前まで
ノビエが発生してから散布



成分数
2

テッケン

【ヒエ＋広葉】
・1キロ粒剤
移植後15日～ノビエ4葉期
但し、収穫60日前まで



成分数
1

クリンチャーEW

【ヒエのみ】
移植後20日～ノビエ6葉期
但し、収穫30日前まで
ノビエが発生してから散布



成分数
4

ハイカット

【ヒエ＋広葉】
・1キロ粒剤
移植後15日～ノビエ3.5葉期
(但し、収穫60日前まで)



成分数
1

ワイドアタックSC

【ヒエ＋広葉】
移植後20日(イネ5葉期以降)
～ノビエ6葉期(但し、収穫30日前まで)



成分数
2

フォローアップ

【ヒエ＋広葉】
・1キロ粒剤
移植後15日(イネ4葉期以降)
～ノビエ5葉期
但し、収穫60日前まで



成分数
3

**セカンドショットS
ジャンボMX**

【ヒエ＋広葉】
・ジャンボ剤
移植後20日～ノビエ3.5葉期
但し、収穫45日前まで

雑草が残ってれば中・後期除草剤を散布

初中期一発体系

- 上記「初中期一発除草剤」を田植と同時または田植の数日後に処理。
- 除草剤の種類ごとに散布可能な時期が異なる。また1kg粒剤、フロアブル、ジャンボ剤でも同様に散布可能時期が異なる。
- 生育の進んだ雑草には効果が落ちるため適切な時期の散布が重要。