

### 水稻栽培施肥設計

コシヒカリ【標高300m以下】

5月上旬移植

(kg/10a)

| 施肥体系          | 施肥時期<br>肥料名   | 総量   | 元肥   | 中間<br>追肥 | 穂肥   |      | 成分量         |              |             | 摘要   |  |
|---------------|---------------|------|------|----------|------|------|-------------|--------------|-------------|--|--|
|               |               |      |      |          | 1回目  | 2回目  | 窒素          | リン酸          | 加里          |  |  |
|               |               |      |      |          | -18日 | -10日 |             |              |             |  |  |
| 全層施肥体系        | 島コシ化成1号       | 20   | 20   |          |      |      | 2.0         | 4.0          | 3.0         | ・ホスピタは、初期成育が悪い場合、茎数を確保するために、田植20日後までを目処に追加施用する   |  |
|               | リンスター30 } 選   | 10   | 10   |          |      |      |             | 3.0          |             |  |  |
|               | 苦土重焼燐 } 択     | 10   | 10   |          |      |      |             | 3.5          |             |  |  |
|               | (ホスピタ) 摘要参照   | (20) | (20) |          |      |      |             | (1.0)        |             |  |  |
|               | けい酸加里プレミア34   | 20   |      | 20       |      |      |             |              | 4.0         |  |  |
|               | NK化成C-12号 } 選 | 16   |      |          | 10   | 6    | 2.6         |              | 3.2         |  |  |
|               | 穂肥34号 } 択     | 17   |      |          | 17   |      | 2.6         | 0.7          | 2.6         |  |  |
| 成分合計          |               |      |      |          |      | 4.6  | 7.0~<br>9.2 | 9.6~<br>10.2 |             |  |  |
| 側条施肥体系        | 固形40号         | 20   | 20   |          |      |      | 1.6         | 4.8          | 1.6         | ・茎数確保後、穂肥までに葉色が極端に落ちる場合は出穂40日前頃にNKC-12を5kg施用する<br>・ホスピタは、初期成育が悪い場合、茎数を確保するために、田植20日後までを目処に追加施用する                     |  |
|               | (ホスピタ) 摘要参照   | (20) | (20) |          |      |      |             | (1.0)        |             |  |  |
|               | けい酸加里プレミア34   | 20   |      | 20       |      |      |             |              | 4.0         |  |  |
|               | NK化成C-12号 } 選 | 16   |      |          | 10   | 6    | 2.6         |              | 3.2         |  |  |
|               | 穂肥34号 } 択     | 17   |      |          | 17   |      | 2.6         | 0.7          | 2.6         |  |  |
|               | 成分合計          |      |      |          |      |      | 4.2         | 4.8~<br>6.5  | 8.2~<br>8.8 |  |  |
|               | ネオペースト1号      | 15   | 15   |          |      |      | 1.8         | 1.8          | 1.8         |  |  |
| リンスター30 } 選   | 10            | 10   |      |          |      |      | 3.0         |              |             |  |  |
| 苦土重焼燐 } 択     | 10            | 10   |      |          |      |      | 3.5         |              |             |  |  |
| (ホスピタ) 摘要参照   | (20)          | (20) |      |          |      |      | (1.0)       |              |             |  |  |
| けい酸加里プレミア34   | 20            |      | 20   |          |      |      |             | 4.0          |             |  |  |
| NK化成C-12号 } 選 | 16            |      |      | 10       | 6    | 2.6  |             | 3.2          |             |  |  |
| 穂肥34号 } 択     | 17            |      |      | 17       |      | 2.6  | 0.7         | 2.6          |             |  |  |
| 成分合計          |               |      |      |          |      | 4.4  | 4.8~<br>7.0 | 8.4~<br>9.0  |             |  |  |
| 一発施肥体系        | セラコートRワン      | 30   | 30   |          |      |      | 4.5         | 4.5          | 4.5         | ・穂肥は施用しない<br>・側条施肥の場合は基肥を2割減肥<br>・けい酸加里は、中間追肥での施用ができない場合、元肥で2倍施用する<br>・ホスピタは、初期成育が悪い場合、茎数を確保するために、田植20日後までを目処に追加施用する |  |
|               | (ホスピタ) 摘要参照   | (40) | (40) |          |      |      |             | (2.0)        |             |  |  |
|               | けい酸加里プレミア34   | 40   | 40   |          |      |      |             |              | 8.0         |  |  |
|               | 成分合計          |      |      |          |      |      | 4.5         | 4.5~<br>6.5  | 12.5        |  |  |

コシヒカリ【標高300m以下】

5月下旬移植

(kg/10a)

| 施肥体系          | 施肥時期<br>肥料名   | 総量   | 元肥   | 中間<br>追肥 | 穂肥   |      | 成分量         |             |             | 摘要   |  |
|---------------|---------------|------|------|----------|------|------|-------------|-------------|-------------|--|--|
|               |               |      |      |          | 1回目  | 2回目  | 窒素          | リン酸         | 加里          |  |  |
|               |               |      |      |          | -18日 | -10日 |             |             |             |  |  |
| 全層施肥体系        | 島コシ化成1号       | 15   | 15   |          |      |      | 1.5         | 3.0         | 2.3         | ・ホスピタは、初期成育が悪い場合、茎数を確保するために、田植20日後までを目処に追加施用する   |  |
|               | リンスター30 } 選   | 10   | 10   |          |      |      |             | 3.0         |             |  |  |
|               | 苦土重焼燐 } 択     | 10   | 10   |          |      |      |             | 3.5         |             |  |  |
|               | (ホスピタ) 摘要参照   | (20) | (20) |          |      |      |             | (1.0)       |             |  |  |
|               | けい酸加里プレミア34   | 20   |      | 20       |      |      |             |             | 4.0         |  |  |
|               | NK化成C-12号 } 選 | 16   |      |          | 10   | 6    | 2.6         |             | 3.2         |  |  |
|               | 穂肥34号 } 択     | 17   |      |          | 17   |      | 2.6         | 0.7         | 2.6         |  |  |
| 成分合計          |               |      |      |          |      | 4.1  | 6.0~<br>8.2 | 8.9~<br>9.5 |             |  |  |
| 側条施肥体系        | 固形40号         | 15   | 15   |          |      |      | 1.2         | 3.6         | 1.2         | ・茎数確保後、穂肥までに葉色が極端に落ちる場合は出穂40日前頃にNKC-12を5kg施用する<br>・ホスピタは、初期成育が悪い場合、茎数を確保するために、田植20日後までを目処に追加施用する                     |  |
|               | (ホスピタ) 摘要参照   | (20) | (20) |          |      |      |             | (1.0)       |             |  |  |
|               | けい酸加里プレミア34   | 20   |      | 20       |      |      |             |             | 4.0         |  |  |
|               | NK化成C-12号 } 選 | 16   |      |          | 10   | 6    | 2.6         |             | 3.2         |  |  |
|               | 穂肥34号 } 択     | 17   |      |          | 17   |      | 2.6         | 0.7         | 2.6         |  |  |
|               | 成分合計          |      |      |          |      |      | 3.8         | 3.6~<br>5.3 | 7.8~<br>8.4 |  |  |
|               | ネオペースト1号      | 15   | 15   |          |      |      | 1.8         | 1.8         | 1.8         |  |  |
| リンスター30 } 選   | 10            | 10   |      |          |      |      | 3.0         |             |             |  |  |
| 苦土重焼燐 } 択     | 10            | 10   |      |          |      |      | 3.5         |             |             |  |  |
| (ホスピタ) 摘要参照   | (20)          | (20) |      |          |      |      | (1.0)       |             |             |  |  |
| けい酸加里プレミア34   | 20            |      | 20   |          |      |      |             | 4.0         |             |  |  |
| NK化成C-12号 } 選 | 16            |      |      | 10       | 6    | 2.6  |             | 3.2         |             |  |  |
| 穂肥34号 } 択     | 17            |      |      | 17       |      | 2.6  | 0.7         | 2.6         |             |  |  |
| 成分合計          |               |      |      |          |      | 4.4  | 4.8~<br>7.0 | 8.4~<br>9.0 |             |  |  |
| 一発施肥体系        | セラコートRワン      | 30   | 30   |          |      |      | 4.5         | 4.5         | 4.5         | ・穂肥は施用しない<br>・側条施肥の場合は基肥を2割減肥<br>・けい酸加里は、中間追肥での施用ができない場合、元肥で2倍施用する<br>・ホスピタは、初期成育が悪い場合、茎数を確保するために、田植20日後までを目処に追加施用する |  |
|               | (ホスピタ) 摘要参照   | (40) | (40) |          |      |      |             | (2.0)       |             |  |  |
|               | けい酸加里プレミア34   | 40   | 40   |          |      |      |             |             | 8.0         |  |  |
|               | 成分合計          |      |      |          |      |      | 4.5         | 4.5~<br>6.5 | 12.5        |  |  |

コシヒカリ【標高300m以上】

5月上旬移植

(kg/10a)

| 施肥体系        | 施肥時期<br>肥料名 | 総量          | 元肥   | 中間追肥 | 穂肥   |      | 成分量      |         |  | 摘要  |
|-------------|-------------|-------------|------|------|------|------|----------|---------|--|---|
|             |             |             |      |      | 1回目  | 2回目  | 窒素       | リン酸     | 加理   |   |
|             |             |             |      |      | -18日 | -10日 |          |         |  |   |
| 全層施肥体系      | 島コシ化成1号     | 25          | 25   |      |      |      | 2.5      | 5.0     | 3.8  | ・ホスピタは、初期成育が悪い場合、茎数を確保するために、田植20日後までを目処に追加施用する  |
|             | リンスター30 } 選 | 10          | 10   |      |      |      |          | 3.0     |  |   |
|             | 苦土重焼燐 } 択   | 10          | 10   |      |      |      |          | 3.5     |  |   |
|             | (ホスピタ) 摘要参照 | (20)        | (20) |      |      |      |          | (1.0)   |  |   |
|             | けい酸加里プレミア34 | 20          |      | 20   |      |      |          |         | 4.0  |   |
|             | NK化成C-12号   | 18          |      |      | 10   | 8    | 2.9      |         | 3.6  |   |
|             | 成分合計        |             |      |      |      |      | 5.4      | 8.0~9.5 | 11.4   |   |
| 側条施肥体系      | 粒状肥料        | 固形40号       | 30   | 30   |      |      | 2.4      | 7.2     | 2.4  | ・茎数確保後、穂肥までに葉色が極端に落ちる場合は出穂40日前頃にNK-12を5kg施用する<br>・穂肥34号は出穂20日前に施用する<br>・ホスピタは、初期成育が悪い場合、茎数を確保するために、田植20日後までを目処に追加施用する |
|             |             | (ホスピタ) 摘要参照 | (20) | (20) |      |      |          | (1.0)   |  |   |
|             |             | けい酸加里プレミア34 | 20   |      | 20   |      |          |         | 4.0  |   |
|             |             | 穂肥34号       | 20   |      |      | 20   |          | 3.0     | 0.8  |   |
|             | 成分合計        |             |      |      |      |      | 5.4      | 8.0~9.0 | 9.4  |   |
|             | 側条施肥体系      | ネオペースト1号    | 18   | 18   |      |      | 2.2      | 2.2     | 2.2  | ・茎数確保後、穂肥までに葉色が極端に落ちる場合は出穂40日前頃にNK-12を5kg施用する<br>・ホスピタは、初期成育が悪い場合、茎数を確保するために、田植20日後までを目処に追加施用する                       |
|             |             | リンスター30 } 選 | 20   | 20   |      |      |          | 6.0     |  |   |
| 苦土重焼燐 } 択   |             | 20          | 20   |      |      |      | 7.0      |         |  |   |
| (ホスピタ) 摘要参照 |             | (20)        | (20) |      |      |      | (1.0)    |         |  |   |
| けい酸加里プレミア34 |             | 20          |      | 20   |      |      |          | 4.0     |  |   |
| NK化成C-12号   | 18          |             |      | 10   | 8    | 2.9  |          | 3.6     |  |   |
| 成分合計        |             |             |      |      |      | 5.1  | 8.2~10.2 | 9.8     |  |   |
| 一発施肥体系      | セラコートRワン    | 40          | 40   |      |      | 6.0  | 6.0      | 6.0     | ・穂肥は施用しない<br>・側条施肥の場合は基肥を2割減肥<br>・けい酸加里は、中間追肥での施用ができない場合、元肥で2倍施用する<br>・ホスピタは、初期成育が悪い場合、茎数を確保するために、田植20日後までを目処に追加施用する |   |
|             | リンスター30 } 選 | 10          | 10   |      |      |      | 3.0      |         |  |   |
|             | 苦土重焼燐 } 択   | 10          | 10   |      |      |      | 3.5      |         |  |   |
|             | (ホスピタ) 摘要参照 | (40)        | (40) |      |      |      | (2.0)    |         |  |   |
|             | けい酸加里プレミア34 | 40          | 40   |      |      |      |          | 8.0     |  |   |
| 成分合計        |             |             |      |      |      | 6.0  | 9.0~11.5 | 14.0    |  |   |

ハナエチゼン

(kg/10a)

| 施肥体系      | 施肥時期<br>肥料名 | 総量          | 元肥 | 中間追肥 | 穂肥   |      | 成分量      |         |     | 摘要  |   |
|-----------|-------------|-------------|----|------|------|------|----------|---------|-----|---|---|
|           |             |             |    |      | 1回目  | 2回目  | 窒素       | リン酸     | 加理  |   |   |
|           |             |             |    |      | -25日 | -15日 |          |         |     |   |   |
| 全層施肥体系    | い〜ね463      | 30          | 30 |      |      |      | 4.2      | 4.8     | 3.9 |   |   |
|           | リンスター30 } 選 | 10          | 10 |      |      |      |          | 3.0     |     |   |   |
|           | 苦土重焼燐 } 択   | 10          | 10 |      |      |      |          | 3.5     |     |   |   |
|           | NK化成C-12号   | 20          |    |      | 10   | 10   | 3.2      |         | 4.0 |   |   |
|           | 成分合計        |             |    |      |      |      | 7.4      | 7.8~8.3 | 7.9 |   |   |
| 側条施肥体系    | 粒状肥料        | 固形40号       | 35 | 35   |      |      | 2.8      | 8.4     | 2.8 | ・茎数確保後、穂肥までに葉色が極端に落ちる場合は出穂40日前頃にNK-12を5kg施用する |   |
|           |             | 穂肥34号       | 21 |      |      | 21   |          | 3.2     | 0.8 |   | 3.2   |
|           | 成分合計        |             |    |      |      |      | 6.0      | 9.2     | 6.0 |   |   |
|           | ペースト肥料      | ネオペースト1号    | 25 | 25   |      |      | 3.0      | 3.0     | 3.0 |   | ・茎数確保後、穂肥までに葉色が極端に落ちる場合は出穂40日前頃にNK-12を5kg施用する |
|           |             | リンスター30 } 選 | 20 | 20   |      |      |          | 6.0     |     |   |   |
| 苦土重焼燐 } 択 |             | 20          | 20 |      |      |      | 7.0      |         |     |   |   |
| NK化成C-12号 | 20          |             |    | 10   | 10   | 3.2  |          | 4.0     |     |   |   |
| 成分合計      |             |             |    |      |      | 6.2  | 9.0~10.0 | 7.0     |     |   |   |

コシヒカリ【省力施肥】

(kg/10a)

| 施肥体系 | 施肥時期<br>肥料名       | 総量 | 元肥 | 中間追肥 | 穂肥   |      | 成分量 |     |     | 摘要 |
|------|-------------------|----|----|------|------|------|-----|-----|-----|----|
|      |                   |    |    |      | 1回目  | 2回目  | 窒素  | リン酸 | 加理  |    |
|      |                   |    |    |      | -25日 | -15日 |     |     |     |    |
| 省力施肥 | けい酸加里入り<br>こめ太郎くん | 40 | 40 |      |      |      | 2.4 | 6.0 | 3.2 |    |
|      | けい酸加里入り<br>こめ次郎くん | 30 |    |      | 30   |      | 2.4 | 0.9 | 2.4 |    |
|      | 成分合計              |    |    |      |      |      | 4.8 | 6.9 | 5.6 |    |

きぬむすめ

(kg/10a)

| 施肥体系   | 施肥時期<br>肥料名 | 総量 | 元肥 | 中間<br>追肥 | 穂肥   |      | 成分量 |              |      | 摘要   |
|--------|-------------|----|----|----------|------|------|-----|--------------|------|--|
|        |             |    |    |          | 1回目  | 2回目  | 窒素  | リン酸          | 加里   |  |
|        |             |    |    |          | -20日 | -10日 |     |              |      |  |
| 全層施肥体系 | い〜ね463      | 25 | 25 |          |      |      | 3.5 | 4.0          | 3.3  |  |
|        | リンスター30 } 選 | 10 | 10 |          |      |      |     | 3.0          |      |  |
|        | 苦土重焼燐 } 択   | 10 | 10 |          |      |      |     | 3.5          |      |  |
|        | NK化成C-12号   | 35 |    | 5        | 20   | 10   | 5.6 |              | 7.0  |  |
|        | 成分合計        |    |    |          |      |      | 9.1 | 7.0~<br>7.5  | 10.3 |  |
| 側条施肥体系 | 固形40号       | 35 | 35 |          |      |      | 2.8 | 8.4          | 2.8  |  |
|        | NK化成C-12号   | 5  |    | 5        |      |      | 0.8 |              | 1.0  |  |
|        | 穂肥34号       | 25 |    |          | 25   |      | 3.8 | 1.0          | 3.8  |  |
|        | 成分合計        |    |    |          |      |      | 7.4 | 9.4          | 7.6  |  |
|        | ネオペースト1号    | 25 | 25 |          |      |      | 3.0 | 3.0          | 3.0  |  |
| ペースト肥料 | リンスター30 } 選 | 20 | 20 |          |      |      |     | 6.0          |      |  |
|        | 苦土重焼燐 } 択   | 20 | 20 |          |      |      |     | 7.0          |      |  |
|        | NK化成C-12号   | 38 |    | 8        | 15   | 15   | 6.1 |              | 7.6  |  |
|        | 成分合計        |    |    |          |      |      | 9.1 | 9.0~<br>10.0 | 10.6 |  |
| 一発施肥体系 | すご稲N25      | 35 | 35 |          |      |      | 8.8 | 3.5          | 3.5  | ・茎数確保後、穂肥<br>までに葉色が極端<br>に落ちる場合は出<br>穂40日前頃にNKC<br>-12を5kg施用する |
|        | リンスター30 } 選 | 10 | 10 |          |      |      |     | 3.0          |      |  |
|        | 苦土重焼燐 } 択   | 10 | 10 |          |      |      |     | 3.5          |      |  |
|        | 成分合計        |    |    |          |      |      | 8.8 | 6.5~<br>7.0  | 3.5  |  |

ヒメノモチ・ココノエモチ・五百万石

(kg/10a)

| 施肥体系   | 施肥時期<br>肥料名  | 総量 | 元肥 | 中間<br>追肥 | 穂肥   |      | 成分量         |               |      | 摘要   |
|--------|--------------|----|----|----------|------|------|-------------|---------------|------|--|
|        |              |    |    |          | 1回目  | 2回目  | 窒素          | リン酸           | 加里   |  |
|        |              |    |    |          | -18日 | -10日 |             |               |      |  |
| 全層施肥体系 | い〜ね463       | 25 | 25 |          |      |      | 3.5         | 4.0           | 3.3  |  |
|        | リンスター30 } 選  | 10 | 10 |          |      |      |             | 3.0           |      |  |
|        | 苦土重焼燐 } 択    | 10 | 10 |          |      |      |             | 3.5           |      |  |
|        | けい酸加里プレミア34  | 20 |    |          |      |      |             |               | 4.0  |  |
|        | NK化成C-12号    | 23 |    |          | 13   | 10   | 3.7         |               | 4.6  |  |
|        | 成分合計         |    |    |          |      |      | 7.2         | 7.0~<br>7.5   | 11.9 |  |
| 側条施肥体系 | 固形40号        | 35 | 35 |          |      |      | 2.8         | 8.4           | 2.8  | ・茎数確保後、穂肥<br>までに葉色が極端<br>に落ちる場合は出<br>穂40日前頃にNKC<br>-12を5kg施用する<br>・穂肥34号は出穂2<br>0日前に施肥する |
|        | けい酸加里プレミア34  | 20 |    | 20       |      |      |             |               | 4.0  |  |
|        | 穂肥34号        | 24 |    |          | 24   |      | 3.6         | 1.0           | 3.6  |  |
|        | 成分合計         |    |    |          |      |      | 6.4         | 9.4           | 10.4 |  |
|        | ネオペースト1号     | 23 | 23 |          |      |      | 2.8         | 2.8           | 2.8  |  |
| ペースト肥料 | リンスター30 } 選  | 20 | 20 |          |      |      |             | 6.0           |      | ・茎数確保後、穂<br>肥までに葉色が極<br>端に落ちる場合は<br>出穂40日前頃に<br>NKC-12を5kg施<br>用する                       |
|        | 苦土重焼燐 } 択    | 20 | 20 |          |      |      |             | 7.0           |      |  |
|        | けい酸加里プレミア34  |    |    | 20       |      |      |             |               | 4.0  |  |
|        | NK化成C-12号    | 23 |    |          | 13   | 10   | 3.7         |               | 4.6  |  |
| 成分合計   |              |    |    |          |      | 6.5  | 8.8~<br>9.8 | 11.4          |      |  |
| 一発施肥体系 | セラコートRワン } 選 | 50 | 50 |          |      |      | 7.5         | 7.5           | 7.5  | ・穂肥は施用しない  |
|        | リンスター30 } 選  | 10 | 10 |          |      |      |             | 3.0           |      | ・側条施肥の場合は<br>2割の減肥   |
|        | 苦土重焼燐 } 択    | 10 | 10 |          |      |      |             | 3.5           |      |  |
|        | 成分合計         |    |    |          |      |      | 7.5         | 10.5~<br>11.0 | 7.5  |  |

神の舞・佐香錦

(kg/10a)

| 施肥体系   | 施肥時期<br>肥料名 | 総量          | 元肥 | 中間追肥 | 穂肥          |             | 成分量 |              |             | 摘要  |  |                             |
|--------|-------------|-------------|----|------|-------------|-------------|-----|--------------|-------------|-----|--|-----------------------------|
|        |             |             |    |      | 1回目<br>-18日 | 2回目<br>-10日 | 窒素  | リン酸          | 加理          |     |  |                             |
|        |             |             |    |      |             |             |     |              |             |     |  |                             |
| 全層施肥体系 | い〜ね463      | 22          | 22 |      |             |             | 3.1 | 3.5          | 2.9         |     |  |                             |
|        | リンスター30 } 選 | 10          | 10 |      |             |             |     | 3.0          |             |     |  |                             |
|        | 苦土重焼燐 } 択   | 10          | 10 |      |             |             |     | 3.5          |             |     |  |                             |
|        | けい酸加里プレミア34 | 20          |    |      |             |             |     |              | 4.0         |     |  |                             |
|        | NK化成C-12号   | 17          |    |      | 10          | 7           | 2.7 |              | 3.4         |     |  |                             |
|        | 成分合計        |             |    |      |             |             | 5.8 | 6.5~<br>7.0  | 10.3        |     |  |                             |
| 側条施肥体系 | 粒状肥料        | 固形40号       | 30 | 30   |             |             |     | 2.4          | 7.2         | 2.4 | ・茎数確保後、穂肥までに葉色が極端に落ちる場合は出穂40日前頃にNKC-12を5kg施用する<br>・穂肥34号は出穂20日前に施肥する |                             |
|        |             | 穂肥34号       | 18 |      |             | 18          |     | 2.7          | 0.7         | 2.7 |  |                             |
|        |             | 成分合計        |    |      |             |             |     | 5.1          | 7.9         | 5.1 |  |                             |
|        | ペースト肥料      | ネオペースト1号    | 20 | 20   |             |             |     | 2.4          | 2.4         | 2.4 |  |                             |
|        |             | リンスター30 } 選 | 20 | 20   |             |             |     |              | 6.0         |     |  |                             |
|        |             | 苦土重焼燐 } 択   | 20 | 20   |             |             |     |              | 7.0         |     |  |                             |
|        |             | けい酸加里プレミア34 | 20 |      | 20          |             |     |              |             | 4.0 |  |                             |
|        |             | NK化成C-12号   | 17 |      |             | 10          | 7   | 2.7          |             | 3.4 |  |                             |
|        |             | 成分合計        |    |      |             |             |     | 5.1          | 8.4~<br>9.4 | 9.8 |  |                             |
|        | 一発施肥体系      | セラコートRワン    | 43 | 43   |             |             |     | 6.5          | 6.5         | 6.5 |  | ・穂肥は施用しない<br>・側条施肥の場合は2割の減肥 |
|        |             | リンスター30 } 選 | 10 | 10   |             |             |     |              | 3.0         |     |  |                             |
|        |             | 苦土重焼燐 } 択   | 10 | 10   |             |             |     |              | 3.5         |     |  |                             |
| 成分合計   |             |             |    |      |             |             | 6.5 | 9.5~<br>10.0 | 6.5         |     |  |                             |

改良雄町・ミコトモチ

(kg/10a)

| 施肥体系        | 施肥時期<br>肥料名 | 総量          | 元肥 | 中間追肥 | 穂肥          |             | 成分量         |             |      | 摘要  |  |
|-------------|-------------|-------------|----|------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|-----|--|
|             |             |             |    |      | 1回目<br>-25日 | 2回目<br>-15日 | 窒素          | リン酸         | 加理   |     |  |
|             |             |             |    |      |             |             |             |             |      |     |  |
| 全層施肥体系      | い〜ね463      | 22          | 22 |      |             |             | 3.1         | 3.5         | 2.9  |     |  |
|             | リンスター30 } 選 | 10          | 10 |      |             |             |             | 3.0         |      |     |  |
|             | 苦土重焼燐 } 択   | 10          | 10 |      |             |             |             | 3.5         |      |     |  |
|             | けい酸加里プレミア34 | 20          |    |      |             |             |             |             | 4.0  |     |  |
|             | NK化成C-12号   | 23          |    |      | 13          | 10          | 3.7         |             | 4.6  |     |  |
|             | 成分合計        |             |    |      |             |             | 6.8         | 6.5~<br>7.0 | 11.5 |     |  |
| 側条施肥体系      | 粒状肥料        | 固形40号       | 30 | 30   |             |             |             | 2.4         | 7.2  | 2.4 |  |
|             |             | 穂肥34号       | 25 |      |             | 25          |             | 3.8         | 1.0  | 3.8 |  |
|             |             | 成分合計        |    |      |             |             |             | 6.2         | 8.2  | 6.2 |  |
|             | ペースト肥料      | ネオペースト1号    | 20 | 20   |             |             |             | 2.4         | 2.4  | 2.4 |  |
|             |             | リンスター30 } 選 | 20 | 20   |             |             |             |             | 6.0  |     |  |
|             |             | 苦土重焼燐 } 択   | 20 | 20   |             |             |             |             | 7.0  |     |  |
| けい酸加里プレミア34 | 20          |             | 20 |      |             |             |             | 4.0         |      |     |  |
| NK化成C-12号   | 23          |             |    | 13   | 10          | 3.7         |             | 4.6         |      |     |  |
| 成分合計        |             |             |    |      |             | 6.1         | 8.4~<br>9.4 | 11.0        |      |     |  |

改良雄町・ミコトモチ 一発施肥体系

(kg/10a)

|       |             |    |    |  |  |  |     |             |     |                             |
|-------|-------------|----|----|--|--|--|-----|-------------|-----|-----------------------------|
| 改良雄町  | すご稲N25      | 25 | 25 |  |  |  | 6.3 | 2.5         | 2.5 | ・穂肥は施用しない<br>・側条施肥の場合は2割の減肥 |
|       | リンスター30 } 選 | 10 | 10 |  |  |  |     | 3.0         |     |                             |
|       | 苦土重焼燐 } 択   | 10 | 10 |  |  |  |     | 3.5         |     |                             |
|       | 成分合計        |    |    |  |  |  | 6.3 | 5.5~<br>6.0 | 2.5 |                             |
| ミコトモチ | すご稲N25      | 35 | 35 |  |  |  | 8.8 | 3.5         | 3.5 | ・穂肥は施用しない<br>・側条施肥の場合は2割の減肥 |
|       | リンスター30 } 選 | 10 | 10 |  |  |  |     | 3.0         |     |                             |
|       | 苦土重焼燐 } 択   | 10 | 10 |  |  |  |     | 3.5         |     |                             |
|       | 成分合計        |    |    |  |  |  | 8.8 | 6.5~<br>7.0 | 3.5 |                             |